

表2. 花蓮縣主要癌症死亡原因

民國104年

單位：人、每十萬人口、%

順位	合計						男 性						女 性					
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死 亡 原 因	死亡 人數	每十萬人口		死亡人數 結構比 %
				死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率					死亡率	標準化 死亡率	
1	C00-C97	惡性腫瘤	827	248.6	147.5	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	558	328.6	206.0	100.0	C00-C97	惡性腫瘤	269	165.2	91.2	100.0
2	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	151	45.4	26.6	18.3	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	106	62.4	39.7	19.0	C33-C34	氣管、支氣管和肺癌	45	27.6	15.2	16.7
3	C22	肝和肝內膽管癌	135	40.6	23.9	16.3	C22	肝和肝內膽管癌	98	57.7	35.7	17.6	C22	肝和肝內膽管癌	37	22.7	12.4	13.8
4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	96	28.9	17.2	11.6	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	74	43.6	29.8	13.3	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	30	18.4	10.7	11.2
5	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	86	25.9	17.0	10.4	C18-C21	結腸、直腸和肛門癌	66	38.9	24.3	11.8	C50	女性乳癌	26	16.0	9.9	9.7
6	C50	女性乳癌	26	16.0	9.9 (1)	3.1	C15	食道癌	37	21.8	14.5	6.6	C16	胃癌	15	9.2	4.4	5.6
7	C61	前列腺(攝護腺)癌	25	14.7	7.8 (2)	3.0	C16	胃癌	26	15.3	8.5	4.7	C00-C06, C09-C10, C12-C14	口腔癌	12	7.4	4.0	4.5
8	C16	胃癌	41	12.3	6.4	5.0	C61	前列腺(攝護腺)癌	25	14.7	7.8	4.5	C91-C95	白血病	10	6.1	3.3	3.7
9	C15	食道癌	39	11.7	7.6	4.7	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	18	10.6	6.9	3.2	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	9	5.5	3.1	3.3
10	C82-C85	非何杰金氏淋巴瘤	27	8.1	4.9	3.3	C25	胰臟癌	15	8.8	5.2	2.7	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	8	4.9	3.3	3.0
	C91-C95	白血病	23	6.9	4.5	2.8	C91-C95	白血病	13	7.7	5.7	2.3	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	4.3	2.4	2.6
	其他		178	53.5	30.6	21.5	其他		80	47.1	28.0	14.3	其他		70	43.0	22.5	26.0
11	C25	胰臟癌	21	6.3	3.5	2.5	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	7	4.1	2.1	1.3	C67	膀胱癌	7	4.3	1.9	2.6
12	C56, C57.0-C57.4	卵巢癌	8	4.9	3.3 (1)	1.0	C11	鼻咽癌	6	3.5	2.2	1.1	C25	胰臟癌	6	3.7	1.8	2.2
13	C53, C55	子宮頸及部位未明示子宮癌	7	4.3	2.4 (1)	0.8	C71	腦癌	6	3.5	2.3	1.1	C54	子宮體癌	6	3.7	2.2	2.2
14	C54	子宮體癌	6	3.7	2.2 (1)	0.7	C67	膀胱癌	5	2.9	1.1	0.9	C64	腎臟癌	6	3.7	1.9	2.2
15	C23-C24	膽囊和其他膽道癌	12	3.6	1.7	1.5	C64	腎臟癌	4	2.4	1.5	0.7	C71	腦癌	6	3.7	2.2	2.2

附註：1. 104年年中人口數計332,669 人, 男性169,830 人, 女性 162,839 人。

2. (1)每十萬女性人口死亡率。

(2)每十萬男性人口死亡率。